

برنامج السيطرة على مرض السل

معلومات للوالدين :

حماية طفلك ضد مرض السل

1 ما هو السل؟

السل (التدرن) هو مرض خطير وعادة ما يؤثر على الرئتين و في بعض الأوقات على أجزاء أخرى من الجسم. ينتقل الى أناس أصحاء بواسطة جراثيم تخرج من رئتي شخص مصاب بالمرض عند السعال .

2 كيف أتمكن من حماية طفلي؟

بي سي جي BCG هو ابرة صغيرة تعطى في جلد أعلى الكتف الأيسر . وهو لقاح ممتاز لحماية الأطفال الصغار من الأنواع الخطيرة من مرض السل (التدرن) .

3 من يجب أن يحصل على لقاح بي سي جي؟

هناك عدد صغير من الأطفال يخضعون لهذا المعيار و يأخذوا اللقاح . انه لا يعطى عادة و بصورة روتينية الى كافة الأطفال .

- لقاح بي سي جي يقدم الى الاطفال الحديثي الولادة و الذين هم معرضين للاصابة أكثر من غيرهم و يمكن تعريفهم ب :
 - أنهم يعيشوا في بيت أو مع عائلة فيها شخص مصاب بالسل حالياً أو كان مصاب بالسل سابقاً .
 - أن أحد الوالدين أو كلاهما من أبناء جزر المحيط الهادئ (الباسيفيك) .
 - أن الوالدين أو أحد الساكنين في البيت عاشوا لمدة ستة أشهر أو أكثر** و خلال الخمس سنوات الماضية في دول فيها نسبة عالية من الاصابات بالسل .
 - أنهم عاشوا خلال السنوات الخمس الاولى من عمرهم و لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر في بلد* فيه نسبة الاصابة بالسل عالية .
- * كافة الدول ما عدا أستراليا ، النمسا ، بلجيكا ، كندا ، الجمهورية التشيكية ، الدنمارك ، فنلندا ، فرنسا ، المانيا ، اليونان ، هولندا ، ايسلاندا ، ايرلندا ، اسرائيل ، ايطاليا ، لكسمبورغ ، مالطة ، موناكو ، نيوزيلندا ، النرويج ، سلوفاكيا ، السويد ، سويسرا ، المملكة المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية .

** ان هذا التأشير غير قاطع . يُنصح باللقاح اذا كان الشخص مولود في بلد غريب وقد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر و خلال السنوات الخمس الماضية في بلد نسبة الاصابة فيه عالية .

4 ما هو أفضل وقت لإعطاء طفلي لقاح بس سي جي؟

أفضل وقت يأخذ فيه طفلك لقاح بي سي جي هو خلال الأيام الأولى من الولادة . يمكن ترتيب هذا و أنت لا تزالين في المستشفى أو في عيادة عامة . تكلمي مع طبيبك أو مع القابلة بهذا الموضوع . سوف يطلبوا منك التوقيع على استمارة موافقة .

5 هل هناك كلفة للقاح بي سي جي؟

ان لقاح بي سي جي مجاني للأطفال المستحقين .

6 ماذا يحدث عادةً بعد أخذ لقاح بي سي جي؟

- احمرار خفيف يظهر في محل الابرة بعد مدة اسبوع الى ستة أسابيع . يستغرق هذا عادة عدة اسابيع الى أن يندمل .
- سوف تترك أثر بسيط في موقع الابرة .
- يمكن في بعض الاحيان أن يدمع مكان الابرة لفترة شهرين . هذا هو رد فعل اعتيادي . يفضل تغطية منطقة الابرة التي تدمع بضماد جاف (قطعة شاش وليس شريط ضماد لاصق) .

7 يجب عليك مراجعة ممرضة الصحة العامة اذا :

- ظهر خراج في المكان .
- احمرار مع ألم و خلال أول يومين بعد الابرة .
- استمر التدمع من مكان الابرة لمدة أكثر من شهرين .

8 اذا احتجت الى معلومات أكثر يرجى الاتصال بـ :

الاسم : _____
هاتف : 262 1855

أفضل وقت : _____