

結核病防治計劃

家長需知

保護您的嬰兒免於感染結核病

1 何謂結核病?

結核病 (俗稱癆病, 簡稱 TB) 是一種通常感染於病人肺部的嚴重疾病, 有時亦會侵襲其他身體器官。此病症是由帶原者的肺中所咳出的細菌, 經空氣傳染給健康的人。

2 如何保護您的嬰兒?

卡介苗(亦稱 BCG 疫苗)是一種施打於左上臂的小型皮下注射疫苗, 對於保護幼兒免於感染嚴重型結核病(TB)有很好的效果。

3 誰應該接受卡介苗(BCG) 疫苗注射?

只有少數的嬰兒符合可接受此疫苗注射的條件, 此疫苗並非例行施打於所有嬰兒。

新生兒卡介苗(BCG)通常施用於對結核病有較高受感染風險的嬰兒。此類嬰兒定義如下:

- 將會與患結核病或曾經患有結核病的家人同住的嬰兒。
- 嬰兒的雙親中有一方或雙方皆是來自太平洋島國。
- 在最近五年當中, 有父母或家人曾經在高結核病風險的國家中居住六個月以上**的嬰兒。
- 該嬰兒在滿五歲以前將會在結核病發病率高的國家*居住三個月以上。

*下列國家除外, 澳洲、奧地利、比利時、加拿大、捷克斯拉夫共和國、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、荷蘭、冰島、愛爾蘭、以色列、意大利、盧森堡、馬爾他共和國、摩納哥、紐西蘭、挪威、斯洛伐克、瑞典、瑞士、英聯合王國及美國。

**此一指示並非絕對。如果嬰兒的雙親中有任何一方是在本國以外地區出生, 並曾經在最近五年內居住於結核病發病率高的國家至少六個月, 給與嬰兒此疫苗注射是較明智的選擇。

4 何時是給嬰兒施打卡介苗(BCG)的最佳時機?

在嬰兒出生後數天內是施打卡介苗(BCG)的最佳時機。疫苗注射可以在當您還未出院之前與院方安排,或在地方社區診所施行。請與您的助產士或家庭醫師討論相關事宜,您也將會需要簽署一份同意書。

5 注射卡介苗(BCG)的費用為何?

對於合格的病人,卡介苗(BCG)疫苗注射是免費的。

6 卡介苗(BCG)注射後的正常情況為何?

- 在疫苗接種後一至六週,注射的位置會出現小型局部紅腫。此症狀需要數週的時間才會復原。
- 疫苗注射的位置將會留下一小塊疤痕。
- 在某些情況下,紅腫的部位會流出液狀物長達兩個月之久,這是注射後的正常反應。此時應在紅腫傷口上以乾敷料包紮為佳(應使用乾淨紗布而非自黏繃帶)。

7 如果有以下情況,您需要與公共健康護士聯絡:

- 在疫苗注射處有潰瘍情形產生。
- 在疫苗接種後兩天之內即產生局部紅腫的情形。
- 從紅腫的部位流出液狀物的情形持續超過兩個月以上。

8 如果您需要更多的資訊,請聯絡:

姓名: _____ 稱號: _____

Ph: 262 1855

最佳聯絡時間: _____