طرح کنترل مرض سل

اطلاعات برای والدین

چگونه میتوان کودک خود را در مقابل مرض سل محافظت کرد؟

۱- مرض سل چیست؟

سل (TB) مرضی است وخیم که معمولا روی ششها و گاهی روی سایر قسمتهای بدن اثر میگذارد. میکرب این بیماری از طریق سرفه افراد مبتلا به سل، از شُش آنها خارج شده و به افراد سالم سرایت پیدا میکند.

۲- چگونه میتوان کودک خود را در مقابل سل محافظت کرد؟

ب ث ژ (BCG) تزریق جزئی در پوست بازوی دست چپ است. این تزریق در محافظت کودکان خردسال در مقابل اشکال وخیم مرض سل(TB) خیلی مؤثر است.

۳- تزریق ب ث ژ (BCG) برای چه کسانی است؟

تنها تعداد معدودی از کودکان واجد شرایط این واکسیناسیون میشوند. این تزریقی **نیست** که بطور معمول برای همه کودکان تجویز شود.

ب ث ژ نوزاد (Neonatal BCG) برای اطفال نوزاد تجویز میشود و این در شرایطی است که خطر مرض سل بالا است و نوزاد :

- درخانه یا خانواده با شخص دیگری که مبتلا به مرض سل است و یا سابقا چنین مرضی داشته زندگی میکند.
- یکی از والدین او یا هردو آنها جزء مردمان پاسیفیک (Pacific) شناخته میشوند.
- پدر و مادر یا یکی از افراد خانه در مدت ۵ سال گذشته در یکی از کشورهائیکه* در آنها موارد فراوانی از مرض سل مشاهده میشود، بمدت ۶ ماه یا بیشتر زندگی کرده باشند.
- در پنج سال اول زندگی اش بمدت ۳ ماه یا بیشتر در کشوری** اقامت خواهد داشت که در آن موارد فراوان مرض سل مشاهده میشود.

*این یک دستور پزشکی مطلق نیست. این واکسیناسیون قابل توصیه به بزرگسالانی هم هست که در کشور دیگری زاده شده و در ۵ سال گذشته حداقل ۶ ماه در یک کشور با میزان بالای بیماران مبتلا به سل زندگی کرده باشند

**تمامی کشورها بجز استرالیا، اطریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هلند، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، لوکزامبورک، مالتا، موناکو،

نیوزیلند، نروژ، اسلواکی، سوئد، سوئیس، انگلستان، و امریکا.

۴- مناسب ترین وقت برای تزریق ب ث ژ به کودک چه زمانی است؟

مناسبترین زمان برای تزریق ب ث ژ به کودک شما چند روز اول بعد از تولد اوست. ترتیب آن ممکن است قبل از اینکه از بیمارستان مرخص شوید یا در درمانگاه محل داده شود. در این مورد با دکتر خانوادگی (GP) یا با ماما (midwife) صحبت کنید. از شما خواسته خواهد شد تا فرم رضایتنامه را امضاء کنید.

۵- آیا تزریق ب ث ژ هزینه دارد؟

واکسیناسیون ب ث ژ برای مراجعین واجد شرایط رایگان است.

۶- معمولا بعد از تزریق ب ث ژ چه اتفاقی می افتد؟

- یک الی شش هفته بعد از واکسیناسیون، زخم سرخ رنگ کوچکی در محل تزریق ظاهر میشود که بهبود آن چند هفته طول میکشد.
- جای زخم در محل تزریق باقی خواهد ماند.
- گاهی این زخم تا ۲ ماه مایع از خود ترشح میکند. این یک واکنش طبیعی است. بهتر است که زخم ترشح کننده با پانسمان خشک پوشانده شود (مثلا با گاز **نه** با چسب زخم).

۷- ضروریست که با پرستار بهداشت عمومی در موارد زیر تماس بگیرید:

- اگر محل تزریق آبسه کند
- اگر زخم در یک تا دو روز بعد از تزریق ظاهر شود
- اگر ترشح زخم بیش از دو ماه طول بکشد

۸- چنانچه اطلاعات بیشتری لازم داشته باشید لطفا با فرد ذیل تماس بگیرید:

نام : _____

مسئولیت : _____

تلفن : ۱۸۵۵ ۲۶۲

زمان مناسب : _____