

결핵 예방 프로그램

부모님께 위한 정보

여러분의 아가 결핵으로부터 지키기

1. 결핵이란 무엇인가?

결핵(TB)은 주로 폐에 영향을 미치며 간혹 몸의 다른 부분에도 영향을 미치는 심각한 질병입니다. 이 병에 걸린 사람의 폐에서 기침할 때 나온 병균에 의해 건강한 사람에게 전염됩니다.

2. 우리 아기를 어떻게 보호할 수 있나?

BCG 는 왼쪽 위팔의 피부에 맞는 작은 주사입니다. 이 주사는 어린이들을 심각한 형태의 결핵으로부터 보호하는 데 아주 좋습니다.

3. BCG 접종은 누가 필요한가?

이 백신접종이 필요한 아가들은 아주 소수입니다. 모든 아가에게 일상적으로 접종 되는 것이 아닙니다.

신생아의 BCG 는 아래와 같이 밝혀진, 결핵에 걸릴 확률이 높은 유아에게 제공됩니다.

- 현재나 과거에 결핵의 병력이 있는 사람과 같은 집에 거주하게 되거나 그러한 사람이 가족 중에 있는 경우.
- 부모의 한 쪽이나 양 쪽이 퍼시픽(Pacific) 사람인 경우
- 부모나 가족 일원이 지난 5 년 이내에 6 개월 이상** 결핵이 다발하는 국가에 거주한 경우
- 생후 5 세까지의 기간 중 3 개월 이상 다발 국가*에 거주할 경우.

*아래를 제외한 모든 국가

오스트레일리아, 오스트리아, 벨기에, 캐나다, 체코 공화국, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 네덜란드, 아이슬란드, 아일랜드, 이스라엘, 이태리, 룩셈부르크, 몰타, 모나코, 뉴질랜드, 노르웨이, 슬로바키아, 스웨덴, 스위스, 영국, 미국

**이 지시사항은 절대적인 것이 아닙니다. 일반적으로 그 사람이 외국에서 태어났고 지난 5년 이내에 다발 국가에 6개월이상 거주했다면 예방접종이 바람직합니다.

4. **BCG 접종에 가장 좋은 시기는?**

여러분 아기의 BCG 접종에 가장 좋은 시기는 생후 수일 이내 입니다. 퇴원 전에 병원에서 또는 지역 클리닉에서 가능합니다. 미드와이프나 GP(가정의)에게 상의하십시오. 동의서에 서명이 필요합니다.

5. **BCG 접종의 비용은?**

해당자격이 되는 경우 무료입니다.

6. **BCG 접종 후에는?**

- 접종 1-6 주 후에 접종부위에 작고 붉은 상처가 나타날 수 있습니다. 몇 주가 지나면 아물게 됩니다.
- 접종부위에 작은 흉이 남게 됩니다.
- 간혹 상처에서 2 개월 정도 진물이 나옵니다. 이것은 정상적인 반응입니다. 고름이 나오는 것은 마른 드레싱(반창고가 아닌 거즈)으로 덮어 두는 것이 가장 좋습니다.

7. **Public Health Nurse(공중 보건 간호사)에게 연락해야 하는 경우:**

- 화농이 생긴 경우
- 접종 이틀 후 상처가 생긴 경우
- 진물이 2 개월이상 계속 될 경우

8. **더 자세한 정보가 필요하시면:**

이름: _____ 직위: _____

전화:262 1855

가장 좋은 시간: _____