

CHƯƠNG TRÌNH NGỪA BỆNH LAO PHỔI

Bản tin cho bậc cha mẹ:

BẢO VỆ CON CÁI TRÁNH LAO PHỔI

1 Lao phổi là gì?

Lao phổi (viết tắt: TB) là một bệnh nghiêm trọng thường nhiễm vào phổi, đôi khi cũng nhiễm vào một vài bộ phận khác trong cơ thể. Lao phổi phát sinh trong cơ thể người khỏe mạnh do vi trùng mà người mắc bệnh này ho ra.

2 Làm sao để bảo vệ con cái tránh lao phổi?

Thuốc ngừa lao BCG là một mũi thuốc nhỏ chích vào da phần đầu cánh tay trái. Thuốc này bảo vệ trẻ con tránh những hình thức nghiêm trọng của lao phổi (TB) rất công hiệu.

3 Ai nên chích thuốc ngừa lao BCG?

Chỉ một số ít trẻ con sơ sinh có tiêu chuẩn cần chủng ngừa. Không cần chích ngừa đều đặn cho tất cả trẻ con.

Thuốc ngừa lao BCG cho trẻ sơ sinh có thể dùng cho trẻ con từ một đến bảy tuổi, người ta xác định các trẻ con có nguy cơ mắc bệnh lao phổi khi chúng:

- ❖ sẽ ở chung nhà hay trong gia đình / hay gia đình kiểu Tân tây lan (người Maori) trong đó có một người hoặc đang mắc bệnh lao phổi, hoặc đã từng mắc bệnh đó.
- ❖ có cha hoặc mẹ, hay cả hai cha mẹ là người Đảo Thái Bình Dương.
- ❖ có cha mẹ hay những người trong nhà mà trong năm vừa qua, đã ở một thời gian sáu tháng hay lâu hơn ở các nước ** có tỉ lệ cao về lao phổi.
- ❖ trong năm đầu đời sẽ ở một thời gian sáu tháng hay lâu hơn tại một nước có tỉ lệ lao phổi cao*.

* Tất cả các nước ngoại trừ Úc, Áo, Bỉ, Gia Nã Đại, Cộng hòa Czech, Đan mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hi Lạp, Hòa Lan, Iceland, Do Thái, Ý, Lục Xâm Bảo, Malta, Monaco, Tân Tây Lan, Na Uy, Slovakia, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Anh, và Hoa Kỳ.

** Điều này không tuyệt đối. Mọi người thường được nhắc nhở chủng ngừa, nhất là người lớn mà sinh trưởng ở ngoại quốc và trong vòng năm vừa qua, đã ở ít nhất sáu tháng hay lâu hơn tại một nước có tỉ lệ cao về lao phổi.

4 Thời gian nào tốt nhất cho trẻ sơ sinh chích ngừa lao phổi BCG ?

Tốt hơn hết là trẻ sơ sinh nên chích ngừa lao phổi BCG trong vòng vài ngày đầu mới chào đời khi người mẹ còn nằm bệnh viện, hay có thể chích ở Phòng Y tế Công đồng. Nên bàn với nữ hộ sinh hay bác sĩ toàn khoa. Người mẹ sẽ phải ký vào đơn ứng thuận.

5 Chích ngừa lao phổi BCG có tốn tiền không?

Vệ c chủng ngừa lao BCG miễn phí cho tất cả mọi người i hội đủ điều kiện.

6 Việc gì hay xảy ra sau khi chích ngừa lao phổi BCG?

- ❖ Một mẩn đỏ nhỏ có thể nổi lên, ngay chỗ kim chích, trong vòng một đến sáu tuần. Vết đỏ này sẽ lành sau vài tuần.
- ❖ Chỗ chích có thể để lại một vết sẹo nhỏ.
- ❖ Có khi vết đỏ rỉ nước, rỉ mủ lâu hai tháng. Đây là một phản ứng bình thường mà thôi. Tốt nhất là băng chỗ đó lại bằng miếng vải ga khô (vải ga thưa chứ không phải băng dán).

7 Nên liên lạc với y tá Y tế Công đồng:

- ❖ Chỗ chích bị sưng lên mưng mủ
- ❖ Vết mẩn đỏ nổi lên ngay hai ngày đầu sau khi chích.
- ❖ Vết đỏ tiếp tục rỉ mủ quá hai tháng.

8 Muốn biết thêm chi tiết hãy liên lạc:

Tên: _____ Chức vụ: _____

Điện thoại: 262 1855

Gờ thuận tiện nhất: _____